



Andean Sunside

Odlingsanvisning

EKO

Höst- och vinterpotatis

TIDIGHET/TYP

Andean Sunside är en sen höst- och vinterpotatis med mycket hög torrs substans och mjöliga kokegenskaper. AS innehåller mycket karotin vilket avspeglas i köttfärgen. Sorten har mycket stark motståndskraft mot bladmögel och relativt bra mot brunröta. Särskilt lämplig för potatisproduktion med minimerad insats av bladmögelpreparat. Sorten är lämplig för tvättning och paketering. Ts-halt gör sorten lämplig för mostillverkning och utvald packkvalitet.

Skalfärg	Gul	
Köttfärg	Gul-Orange	9
Knölform	O (oval)	6
Kokegenskap	C (mjölig)	
Knölstorlek	Stor	7
Groningsvila	Medel	5
Ögondjup	Grunda	
Skördenivå	Medel	6
Resistens	Kräfta	mo
	PCN	mo

VÄXTNÄRING

Alla rekommendationer utan hänsyn tagen till aktuella markvärden.

Andean Sunside skall gödslas med en välbalanserad mängd kväve för att uppnå en naturlig avmognad mot slutet. Kalium är viktigt för att säkerställa rätt kokkvalitet. Ökad giva sänker torrs substansinnehållet.

Kväve N	Sandjord	90-120 kg/ha
	Lerjord	80-110 kg/ha
Kalium K	Sandjord	300-350 kg/ha
	Lerjord	250-300 kg/ha

BEVATTNING

Första bevattningen skall vara genomförd före knölsättningen underhåll en jämn fuktighet fram till blastdödning. Sorten är skorkänslig.

SÄTTNING

Andean Sunside bör odlas i fukthållande, varm jord som håller minst 8 C. Förgroning är inte nödvändig. Andean Sunside producerar knölar under en lång tid och ger en hög skörd av relativt oregelbundna knölar. Ett litet sättavstånd är avgörande för att uppnå rätt knölstorlek.

Radavs.	Sättavst.	Plantantal
75 cm	20-22 cm	ca 60 000 st
85 cm	20-22 cm	ca 55 000 st

BLASTDÖDNING

Blastdödningen skall ske vid rätt inre kvalitet. Kombinera TS-provtagningen med egna provkokningar för bästa resultat. Blasten växer under större delen av säsongen och bibehåller sin gröna färg. Den specifika vikten skall ligga emellan 1.088–1.098 eller UWW 405-450.

LAGRING OCH HANTERING

Andean Sunside har kort groningsvila och lämpar sig ej för lagring hela säsongen. Sorten skall lagras vid en stabil temperatur ca 4-5 C med god ventilation, kondens måste undvikas. Ett friskt utsäde, en god hygien i lagret och en torr skalyta reducerar förekomsten av eventuell skalmissfärgning.