

Arielle


Odlingsanvisning

Färskpotatis

TIDIGHET/TYP

Arielle är en tidig till medeltidig färskpotatis med ett tilltalande utseende som väl lämpar sig för tvättning, skalning och paketering.

Skalfärg	Gul	
Köttfärg	Ljus gul	6
Knölform	O (oval)	7
Kokegenskap	A (fastkokande)	
Knölstorlek	Stora	7
Groningsvila	Kort	5
Ögondjup	Grunda	
Skördenivå	Hög	8
Resistens	Kräfta	im
	PCN	rA



VÄXTNÄRING

Alla rekommendationer utan hänsyn tagen till aktuella markvärden.

Arielle kan skördas som tidig färsk alternativt som en sommarpotatis för konsumtion under sen sommar eller tidig höst. Beroende på användningsområde kräver Arielle olika kvävegivor för optimal smak och kvalitet.

Kväve N	Färskpotatis	40-60 kg/ha
	Sommarpotatis	60-90 kg/ha
	Tidig höst	90-100 kg/ha

Kalium K	Färskpotatis	200-250 kg/ha
	Annan anv.	225-280 kg/ha

BEVATTNING

Första bevattningen skall vara genomförd före knölsättningen. Vidhåll en jämn fuktighet fram till blastdödning.

FÖRGRONING

Arielle behöver 1-2 veckor längre förgroningstid jämfört med andra färsksorter.

SÄTTNING

Arielle skall sättas i varmjord som håller minst 8 C (färskodling undantagen) i kombination med betning mot Rhizoctonia. Arielle skall sättas med ett stort plantantal för att uppnå en hög skörd med rätt knölstorlek.

Färskpotatis

Radavs.	Sättavst.	Plantantal
75 cm	26-28 cm	ca 50 000 st

Sommarpotatis

Radavs.	Sättavst.	Plantantal
75 cm	22-24 cm	ca 55 000 st
85 cm	22-24 cm	ca 48 000 st

BLASTDÖDNING

Blastdödningen skall ske vid rätt inre kvalitet och inte efter knölstorlek. Låt blasten tappa färg innan blastdödning. Kombinera TS-provtagningen med egna provkokningar för bästa resultat. Den specifika vikten skall ligga emellan 1.070-1.080 eller UWW 327-371.

LAGRING OCH HANTERING

Arielle omsätts under sommar och höst i första hand men går utmärkt att lagra under höst-förvinter. Tänk på att hantera saftspänd potatis särskilt varsamt för att undvika mekaniska skador.